

پیش از شروع مصرف ریزولانگ® محتوای بروشور بیمار را مطالعه نمایید. این بروشور د ریزولانگ® پاسخ سوالات شایع در مورد ریزولانگ® است. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن به میزان مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. برای گزارش عوارض جانبی، با شرکت نواوران دارویی کیمیا با شماره +۹۸۲۱۶۴۳۳۰۱۴ و یا از طریق ایمیل medical@kimia-pharma.co در تماس باشید. این بروشور را قبل از شروع مصرف ریزولانگ® با دقت بخوانید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شماست. این بروشور جایگزینی برای صحبت با پزشک یا توصیه‌های درمانی پزشک نمی‌باشد.

ترکیبات
هر کپسول ریزولانگ® ۲۰۰ میلی‌گرم، حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم کریزوتینیب است.
هر کپسول ریزولانگ® ۲۵۰ میلی‌گرم، حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم کریزوتینیب است.

مکانیسم اثر
کریزوتینیب مهارکننده گیرنده‌های تیروزین کیناز می‌باشد. در جمله MET, ALK, ROS1, HGF, c-Met, RON است.

فارماکوکینتیک

جذب: میانگین زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی ۴ تا ۶ ساعت و میانگین فرمهی زیستی مطلق دارو ۴۳٪ است.
توزیع: میانگین حجم توزیع (Vss) ریزولانگ® (Vss) ۱۷۷۲ لیتر و میزان اتصال پروتئینی ریزولانگ® ۹۱٪ است.
متابولیسم: ریزولانگ® عمدتاً توسط CYP3A متابولیزه می‌شود.
حذف: میانگین نیمه عمر پایانی پلاسمایی ریزولانگ® ۴۲ ساعت است.
دفع: پس از تجویز یک دوز خوراکی ۲۵۰ میلی‌گرمی ریزولانگ®، شانزده تا ۲۵٪ از ماده را در مدفوع و ۶۳٪ (۵۳٪ بدون تغییر) از دوز تجویز شده در مدفوع و ۲۲٪ (۲/۳ بدون تغییر) در ادرار با زاریابی شد.

موارد مصرف

ریزولانگ® یک مهارکننده کیناز است که برای درمان موارد زیر تجویز می‌شود:

- بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک (NSCLC) که تومورهای آنها همانطور که توسط آزمایش تأیید شده FDA شناسایی شده اند (مانند ROS1 یا ALK) مثبت می‌باشد.
- کودکان بیمار ۱ ساله و بزرگ‌تر و نیز بزرگسالان جوان مبتلا به لنفوم سلول بزرگ آنابلاستیک سیستمیک (ALCL) متواسیون ALK، عود کننده یا مقاوم به درمان.
- محدودیت‌های استفاده؛ ایمنی و اثر بخشی ریزولانگ® در افراد مسن مبتلا به ALCL سیستمیک یا متواسیون ALK و عود کننده یا مقاوم به درمان ثابت نشده است.
- بیماران بزرگسال و کودکان یک ساله و بزرگ‌تر با تومور میوفیوبلاستیک ALK مثبت التهابی غیر قابل جراحی (IMT)، عود کننده یا مقاوم به درمان.

ایمنی و اثر بخشی ریزولانگ® در بزرگسالان مسن مبتلا به ALCL یا در کودکان کمتر از ۱ سال مبتلا به ALCL یا IMT مشخص نیست.

مقدار و نحوه مصرف

- NSCLC متاستاتیک: دوز توصیه شده ۲۵۰ میلی‌گرم به صورت خوراکی دو بار در روز.
- ALCL سیستمیک: دوز توصیه شده ۲۸۰ mg/m² به صورت خوراکی دو بار در روز بر اساس سطح بدن.
- IMT غیرقابل برداشت: دوز توصیه شده ۲۵۰ میلی‌گرم خوراکی دو بار در روز.
- بزرگسالان: دوز توصیه شده ۲۵۰ میلی‌گرم خوراکی دو بار در روز.
- کودکان: دوز توصیه شده ۲۸۰ mg/m² به صورت خوراکی دو بار در روز بر اساس سطح بدن.

عوارض جانبی

ریزولانگ® نیز مانند تمامی داروهای دیگر می‌تواند موجب بروز عوارض ناخواسته‌ای شود. قابل ذکر است که این عوارض در همه افراد مصرف کننده بروز نخواهد کرد. عوارضی که در اینجا نام برده می‌شوند، همه عوارض احتمالی ریزولانگ® را شامل نمی‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف ریزولانگ® شامل موارد ذیل می‌باشد:

- مشکلات کبدی:** ریزولانگ® ممکن است باعث آسیب کبدی تهدید کننده زندگی شود. پزشک در طول ۲ ماه اول درمان با ریزولانگ® هر ۴ هفته یک بار یک سونوگرافی و در صورت ماهانه، به منظور بررسی عملکرد کبد برای شما آزمایش خون تجویز خواهد کرد. در صورت بروز جدید یا بدتر شدن هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:
 - زرد شدن پوست یا قسمت سفید چشم
 - خستگی شدید
 - کاهش اشتها
 - ادرار تیره یا قهوه‌ای (به رنگ چای)
 - حالت تهوع یا استفراغ
 - خارش
 - در در سمت راست شکم
 - خونریزی یا شرایطی که در آن به راحتی کبود می‌شوید
- مشکلات ریوی (پنومونی):** ریزولانگ® ممکن است باعث مشکلات ریوی تهدید کننده زندگی شود. علائم این عارضه ممکن است مشابه علائم سرطان ریه باشند. در صورت تشدید یا ایجاد علائم زیر فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:
 - مشکل تنفسی یا تنگی نفس
 - سرفه یا یا بدون مخاط
 - تب
- مشکلات قلبی:** ریزولانگ® ممکن است باعث افزایش یا کاهش ضربان قلب یا ضربان قلب غیر طبیعی شود. پزشک ضربان قلب و فشار خون شما را در طول درمان با ریزولانگ® به طور منظم بررسی می‌کند. اگر احساس سرگیجه یا غش کردید یا ضربان قلب غیر طبیعی دارید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید. در صورتی که از دروهای قلبی یا فشار خون استفاده می‌کنید، به پزشک خود اطلاع دهید.
- مشکلات شدید بینایی:** بروز مشکلات بینایی با ریزولانگ® رایج است. این مشکلات معمولاً در عرض ۱ هفته پس از شروع درمان با ریزولانگ® بروز پیدا می‌کنند. مشکلات بینایی با ریزولانگ® می‌توانند شدید باشند و ممکن است باعث از دست دادن جزئی یا کامل بینایی در یک یا هر دو چشم شود. پزشک شما ممکن است درمان شما را به صورت موقت یا برای همیشه متوقف کند و در صورت بروز هر گونه مشکل بینایی در طول درمان با ریزولانگ®، شما را به یک متخصص چشم ارجاع دهد. اگر علائم مشکلات بینایی، از دست دادن بینایی یا هر تغییر در بینایی خود از جمله موارد زیر داشتید فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:
 - نوری که چشمان شما را آزار می‌دهد
 - دید دوگانه
 - نور
 - علائم جدید مگس پرواز یا شدیدتر شدن آن
 - تاری دید
- علاوه بر این، برای کودکان یا بزرگسالان جوانی که ریزولانگ® را برای درمان لنفوم سلول بزرگ آنابلاستیک (ALCL) مصرف می‌کنند یا کودکانی که برای درمان تومور التهابی میوفیوبلاستیک (IMT) مصرف می‌کنند: پزشک ممکن است قبل از شروع و نیز پس از یک ماه از شروع درمان با ریزولانگ®، شما را به یک متخصص چشم به منظور بررسی مشکلات بینایی ارجاع دهد. پزشک شما ممکن است نوسان بینایی یا در صورت بروز تشدید، مصرف مکمل‌های الکترولیت یا سایر انواع حمایت‌های تغذیه‌ای را تجویز کند.
- مشکلات شدید معده، روده و دهان در کودکان یا بزرگسالان جوان مبتلا به ALCL یا کودکان مبتلا به IMT:** ریزولانگ® ممکن است باعث اسهال شدید، حالت تهوع، استفراغ یا زخم‌های دهان شود. در صورتی که در طول درمان با ریزولانگ® مشکلات بلع داشتید یا دچار استفراغ یا اسهال شدید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.
 - پزشک شما ممکن است در صورت نیاز برای پیشگیری از درمان اسهال، حالت تهوع و استفراغ دارو تجویز کند.
 - همچنین پزشک شما ممکن است نوشیدنی‌های مایعات بیشتر یا در صورت بروز تشدید، مصرف مکمل‌های الکترولیت یا سایر انواع حمایت‌های تغذیه‌ای را تجویز کند.

در صورت بروز هر کدام از علائم ذکر شده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

شایع‌ترین عوارض جانبی ریزولانگ® در افراد مبتلا به NSCLC عبارتند از:

- تورم دست‌ها، پاها، صورت و چشم‌ها
- افزایش فاکتورهای نشان دهنده عملکرد کبد در آزمایش خون
- احساس بی‌حسی یا گزگز در بازوها یا پاها
- سرگیجه
- مشکلات بینایی
- تهوع، اسهال، یا استفراغ
- افزایش فاکتورهای نشان دهنده عملکرد کبد در آزمایش خون
- کاهش اشتها
- عفونت تنفسی فوآنی

شایع‌ترین عوارض جانبی ریزولانگ® در افراد مبتلا به ALCL عبارتند از:

- مشکلات بینایی
- تهوع، اسهال، یا استفراغ
- درد ناحیه شکم (معده)
- سردرد
- مشکلات بینایی
- سرفه
- خستگی
- تب
- کاهش تعداد سول‌های خونی

شایع‌ترین عوارض جانبی ریزولانگ® در بزرگسالان مبتلا به IMT عبارتند از:

- مشکلات بینایی
- حالت تهوع
- تورم دست‌ها، پاها، صورت یا چشم‌ها

شایع‌ترین عوارض جانبی ریزولانگ® در کودکان مبتلا به IMT عبارتند از:

- اسهال، استفراغ، یا تهوع
- درد ناحیه شکم (معده)
- مشکلات بینایی
- عفونت تنفسی فوآنی
- سرفه
- درد عضلات و مفاصل
- تورم دست‌ها، پاها، صورت یا چشم‌ها
- تب
- بی‌وسستی
- سردرد

برای مشاوره پزشکی در مورد عوارض جانبی با پزشک خود تماس بگیرید.

تداخلات دارویی

مهارکننده‌های قوی یا متوسط CYP3A

مصرف همزمان ریزولانگ® با مهارکننده‌های قوی CYP3A ممکن است ریسک بروز عوارض جانبی ریزولانگ® را افزایش دهد. از مصرف همزمان دارو با مهارکننده‌های قوی CYP3A خودداری کنید. در صورتی که استفاده همزمان ناپدید است، دوز ریزولانگ® را کاهش دهید. از مصرف گریپ فروت نیز خودداری کنید. در مصرف همزمان دارو با مهارکننده‌های متوسط CYP3A احتیاط کنید.

الفا کننده‌های قوی CYP3A

مصرف همزمان ریزولانگ® با الفا کننده‌های قوی CYP3A (کاربامازپین، فنوباریتال، فنی‌توئین، ریفامپیسین و غلغ جای) ممکن است اثر بخشی ریزولانگ® را کاهش دهد. از مصرف همزمان دارو با الفا کننده‌های قوی CYP3A خودداری کنید.

سوپستراهای CYP3A

مصرف همزمان ریزولانگ® باعث افزایش خطر بروز عوارض جانبی مربوط به سوپستراهای CYP3A می‌شود. از مصرف همزمان در شرایطی که حداقل تغییرات غلظت ممکن است منجر به عوارض جانبی جدی شود، خودداری کنید. اگر مصرف همزمان ریزولانگ® اجتناب ناپذیر است، دوز سوپسترای CYP3A را طبق دستور پزشک کاهش دهید.

داروهای که فاصله QT را طولانی می‌کنند

ریزولانگ® می‌تواند فاصله QT/QTc را طولانی‌تر کند. از مصرف همزمان ریزولانگ® با داروهای که فاصله QT را طولانی می‌کنند، خودداری کنید.

داروهای که باعث برادری کاردی می‌شوند

ریزولانگ® می‌تواند باعث برادری کاردی شود. از مصرف همزمان ریزولانگ® با داروهای که باعث برادری کاردی می‌شوند (مانند مسدود کننده‌های بتا، مسدود کننده‌های کانال کلسیم غیر دی هیدروپیریدینی، کلونیدین و دیگوکسین) خودداری کنید.

هشدارها

قبل از مصرف ریزولانگ®، در مورد تمام شرایط پزشکی خود به پزشک اطلاع دهید. از جمله اگر:

- به نوزاد خود شیر می‌دهید یا برای شیر دادن به نوزاد خود برنامه دارید.
- مشکلات کبدی یا کلیوی دارید.
- مشکلات قلبی، از جمله سندرم طولانی بودن فاصله QT دارید.
- باردار هستید یا قصد بارداری دارید (ریزولانگ® می‌تواند به جنین شما آسیب برساند).
- مشکلات ریوی دارید.

پزشک خود را در مورد تمام داروهای که مصرف می‌کنید، از جمله داروهای تجویزی یا نسخه‌ای بدون نسخه، ویتامین‌ها و مکمل‌های گیاهی مطلع سازید.

دوز فراموش شده

در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز از ریزولانگ®، به محض یادآوری آن از مصرف کنید اما اگر کمتر از ۶ ساعت به زمان مصرف دوز بعدی باقی مانده است از مصرف آن خودداری کرده و دوز بعدی را طبق برنامه مصرف کنید.

مصرف بیش از حد

در صورت مصرف بیش از حد ریزولانگ® فوراً با پزشک معالج‌تان تماس بگیرید یا بلافاصله به نزدیک‌ترین اورژانس مراجعه کنید.

بارداری و شیردهی

تجویز ریزولانگ® در زنان باردار می‌تواند باعث آسیب به جنین شود.

زنای که قابلیت باروری دارند:

- پزشک شما قبل از شروع درمان با ریزولانگ®، باردار بودن شما را بررسی می‌کند.
- توصیه می‌شود در طول درمان با ریزولانگ® و حداقل تا ۹۰ روز پس از دریافت آخرین دوز ریزولانگ® از روش‌های موثر پیشگیری از بارداری استفاده شود.
- در صورتی که در طول درمان با ریزولانگ® باردار شدید یا فکر می‌کنید ممکن است باردار باشید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

به مردانی که همسرانی با قابلیت باروری دارند توصیه می‌شود در طول درمان با ریزولانگ® و حداقل ۹۰ روز پس از دریافت آخرین دوز دارو از دارو از کاندوم استفاده کنند.

ترشح ریزولانگ® در شیر مادر نامشخص است. بنابراین در طول درمان با ریزولانگ® و نیز ۴۵ روز پس از دریافت آخرین دوز دارو از شیردهی خودداری کنید. با پزشک خود در مورد بهترین راه برای تغذیه کودک در این مدت صحبت کنید.

توصیه به بیمار

- ریزولانگ® باید دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف شود.
- کپسول‌های ریزولانگ® باید به طور کامل بلعیده شوند.
- بیماران می‌توانند این دارو را همراه با غذا مصرف نمایند ولی مصرف این دارو با معده خالی نیز امکان پذیر است.
- در صورت بروز عوارض جانبی خاص، پزشک ممکن است دوز مصرفی شما را تغییر دهد، یا دارو را به صورت موقت یا برای همیشه قطع کند. به صورت خودسرانه دوز داروی خود را تغییر ندهید و مصرف آن را قطع نکنید.
- در صورتی که بعد از مصرف یک دوز ریزولانگ® استفراغ کردید، از مصرف دوز اضافی خودداری کرده و دوز بعدی داروی خود را طبق برنامه مصرف کنید.
- توصیه می‌شود مصرف ریزولانگ® در کودکان تحت نظارت بزرگسالان انجام شود.
- ریزولانگ® می‌تواند باعث تغییر در بینایی، سرگیجه و احساس خستگی شود. اگر هر یک از این علائم را دارید از رانندگی کردن و کار با ماشین آلات خودداری کنید.
- از قرار گرفتن طولانی مدت زیر نور خورشید خودداری کنید. ریزولانگ® می‌تواند باعث حساس شدن پوست شما نسبت به نور خورشید (حساسیت به نور) و سوختگی شود. در صورتی که مجبور به ایستادن زیر نور خورشید هستید از کرم ضد آفتاب و نیز پوشش مناسب به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده کنید.

نحوه نگهداری

- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- ماده جاذب رطوبت را درون بطری نگه دارید و از خوردن آن خودداری کنید.
- دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از داروساز خود بپرسید که چگونه دارویی که دیگر مصرف نمی‌کنید یا تاریخ انقضای آن گذشته است را دور بیندازید.
- مطابق دستورالعمل داروهای سایتوتوکسیک حمل، نگهداری و معدوم گردد.

محتویات بسته

- قوطی حاوی ۶۰ عدد کپسول

ساخت شرکت نواوران دارویی کیمیا، تهران، ایران.
تلفن: ۰۲۱-۶۴۳۳۰۱۴
وبسایت: www.kimia-pharma.co

منابع