

قرص روکش دار تری فلونوماید

تری فلونوماید

پیش از مصرف تری فلونوماید بروشور را به دقت مطالعه نمایید. این بروشور در برگزیده پاسخ سوالات شایع در مورد تری فلونوماید است. این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

برای گزارش عوارض جانبی، با شرکت نوبیرون دارویی کیمیا با شماره ۰۲۱۶۴۳۳۱۴ یا از طریق ایمیل med@kimia-pharma.co در تماس باشید.

این بروشور را قبل از شروع مصرف تری فلونوماید یا دقت بخوانید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شماست. این بروشور جایگزینی برای مشاوره با پزشک یا توصیه‌های درمانی پزشک نیست.

ترکیبات

هر قرص روکش دار تری فلونوماید ۷ میلی‌گرم، حاوی ۷ میلی‌گرم تری فلونوماید می‌باشد. هر قرص روکش دار تری فلونوماید ۱۴ میلی‌گرم، حاوی ۱۴ میلی‌گرم تری فلونوماید می‌باشد.

مکانیسم اثر

تری فلونوماید یک عامل تعدیل‌کننده سیستم ایمنی با خواص ضد التهابی است.

فایده‌های کلینیکی

- جذب: متوسط زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسما پس از مصرف خوراکی تری فلونوماید بین ۱ تا ۴ ساعت است.
- توزیع: میزان اتصال تری فلونوماید به پروتئین‌های پلاسمايي زیاد (۹۹٪ >).
- متابولیسم: تری فلونوماید به عنوان بخش اصلی در گردش در پلاسما شناسایی شده است.
- دفع: تری فلونوماید عمدتاً به صورت داروی تغییر ناپافته توسط سیستم صفراوی به صورت مستقیم دفع می‌شود. علاوه بر این دفع کلیوی متابولیت‌ها نیز وجود دارد. کلیترانس بدنی کلی تری فلونوماید ۳۰/۵ میلی‌لیتر در ساعت می‌باشد.

موارد مصرف

تری فلونوماید جهت درمان اشکال عودکننده متولیت اسکروزیس (ام اس) شامل سندروم ایژوله بالینی، بیماری عودکننده-بهبودیافته و بیماری پیشرونده ثانویه فعال در بزرگسالان تحت نظر پزشک متخصص تجویز می‌شود. اثربخشی و ایمنی تری فلونوماید در کودکان مشخص نیست.

مقدار و نحوه مصرف

درد توصیه شده تری فلونوماید ۷ میلی‌گرم یا ۱۴ میلی‌گرم به صورت خوراکی یک بار در روز است. بیماران می‌توانند این دارو را همراه با غذا مصرف نمایند ولی مصرف این دارو با معده خالی نیز امکان پذیر است.

عوارض جانبی

لازم به ذکر است این عوارض در تمام بیماران رخ نمی‌دهند. عوارضی که در این بروشور ذکر شده شامل کلیه عوارض احتمالی تری فلونوماید نیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عوارض دارو یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

تری فلونوماید ممکن است موجب بروز عوارض جانبی جدی ذیل شود:

- کاهش تعداد گلبول‌های سفید خون: قبل از شروع مصرف تری فلونوماید لازم است تعداد گلبول‌های سفید خون شما بررسی شود. زمانی که تعداد گلبول‌های سفید خون پایین باشد:

ممکن است ابتلا به عفونت‌های مکرر را تجربه کنید: قبل از شروع مصرف تری فلونوماید لازم است آزمایش پوستی به منظور بررسی ابتلا به سل (توبرکلوز) انجام شود. در صورتی که هر یک از علائم ابتلا به عفونت زیر را تجربه می‌کنید پزشک معالج خود را مطلع کنید:

- تب
- خستگی
- دردهای بدنی
- لرز
- تبوع
- استفراغ

در طول درمان با تری فلونوماید و تا ۶ ماه پس از پایان درمان با تری فلونوماید واکنش‌های بخصوصی را دریافت کنید.

واکنش‌های آلرژیک/حساسیت: در صورتی که مشکوک در تشخیص، خارش، تورم در هر قسمت از بدن از جمله لب‌ها، چشم‌ها، گلو و زبان را تجربه می‌کنید، مصرف تری فلونوماید را متوقف کنید و فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید یا به اورژانس مراجعه کنید.

واکنش‌های پوستی شدید: مصرف تری فلونوماید ممکن است باعث بروز واکنش‌های پوستی شدید تهدید کننده حیات شود. در صورتی که هر گونه علامت شامل راش پوستی یا قرمزی و لایه لایه شدن پوست، زخم‌های دهانی و تاول را تجربه می‌کنید، مصرف تری فلونوماید را متوقف کنید و فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید یا به اورژانس مراجعه کنید.

انواع دیگر واکنش‌های آلرژیک یا مشکلات جدی که ممکن است قسمت‌های مختلف بدن شما مانند کبد، کلیه، قلب یا سلول‌های خونی را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است با این نوع واکنش‌ها راش پوستی را تجربه کنید یا نکیتد. سایر علائمی که ممکن است تجربه کنید شامل:

- زرد شدن پوست یا سفیدی چشم‌ها
- درد عضلانی شدید
- غدد لنفاوی متورم
- کبودی یا خونریزی غیر معمول
- ضعف یا خستگی
- التهاب صورت

در صورتی که تب یا راش پوستی را یا هر یک از علائم فوق تجربه می‌کنید، مصرف تری فلونوماید را متوقف کنید و فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

- بی‌حسی یا گزگز دست‌ها و پاها که با علائم ام اس متفاوت باشد. احتمال ابتلا به نوروپاتی محیطی در شما بالا می‌رود اگر:
 - بیش از ۶۰ سال سن دارید
 - مبتلا به دیابت هستید
 - داروهای بخصوصی که بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارند مصرف می‌کنید

در صورتی که بی‌حسی و گزگز دست‌ها و پاها را تجربه می‌کنید که با علائم ام اس متفاوت است به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

بروز مشکلات تنفسی جدید یا تشدید مشکلات تنفسی قبلی: این مشکلات ممکن است جدی و تهدید کننده حیات باشند. در صورت تجربه تنگی نفس یا سرفه یا با بدون تب فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید یا به اورژانس مراجعه کنید.

فشار خون بالا: قبل از شروع مصرف تری فلونوماید و در طول درمان با تری فلونوماید پزشک معالج وضعیت فشار خون شما را بررسی می‌کند.

مشکلات کبدی: مصرف تری فلونوماید ممکن است باعث بروز مشکلات کبدی جدی شود از جمله نارسیایی کبدی که تهدید کننده حیات است و ممکن است بیمار نیاز به پیوند کبد داشته باشد. در صورتی که هم اکنون دچار مشکلات کبدی هستید یا داروهای دیگری مصرف می‌کنید که بر کبد تأثیر می‌گذارد، خطر ابتلا به مشکلات کبدی در شما افزایش می‌یابد. پزشک معالج در جهت بررسی وضعیت کبد آزمایش خون انجام می‌دهد:

- ۶ ماه قبل از شروع مصرف تری فلونوماید
- هر ماه یک بار به مدت ۶ ماه پس از شروع مصرف تری فلونوماید

در صورتی که هر یک از علائم مشکلات کبدی زیر را تجربه می‌کنید فوراً به پزشک معالج خود اطلاع دهید:

- تبوع
- استفراغ
- خستگی
- آدرار تیره رنگ
- درد معده
- زرد شدن پوست یا سفیدی چشم‌ها

تری فلونوماید در بیماران که مبتلا به نارسیایی کبدی شدید هستند، منع مصرف دارویی دارد.

در صورت تجربه هر یک از علائم فوق فوراً با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

شروع تری فلونوماید

- سرفه
- افزایش نتایج آزمایشات خون به منظور بررسی عملکرد کبد
- استفراغ
- تبوع
- نازک شدن و ریزش مو (آلوپسی)

در صورت تجربه هر گونه عارضه جانبی که برایتان آزار دهنده است و از بین نمی‌رود پزشک معالج خود را مطلع کنید.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف همزمان تری فلونوماید با وارفارین شاخص INR باید مورد پایش دقیق قرار گیرد.

- تری فلونوماید ممکن است مقدار اتینیل استرادیول و لوونورسترل در خون را افزایش دهد. در مصرف همزمان داروهای پیشگیری از بارداری با تری فلونوماید، به نوع و مقدار مصرف این داروهای باید توجه نمود.
- در مصرف همزمان این دارو با داروهای مانند آلوسترین، دلوکستین، تنوفیلین و تیزانیدین غلظت داروهای نامبرده در خون کاهش می‌یابد. لذا بیماران جهت تنظیم دوز مصرفی باید تحت نظر باشند.
- در مصرف همزمان این دارو با داروهای مانند پاکلی تاکسل، پیوگلیتازون، ریگلیناید، زینگلینازون، سفاکور، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین، پنی سیلین G، کتوپروفن، فلوپروماید، متوتوکسات و زیدودین غلظت داروهای نامبرده در خون افزایش می‌یابد. لذا بیماران جهت تنظیم دوز مصرفی باید تحت نظر باشند.
- در مصرف همزمان این دارو با زرواستاتین، مقدار مصرف زرواستاتین نباید بیش از ۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز باشد. در مصرف همزمان با داروهای مانند میتوگانترون، متوتوکسات، ریفاپمپین، آتوراستاتین، تانگلیناید، پراوستاتین، ریگلیناید و سیمواستاتین دوز مصرفی این داروهای باید کاهش یابد و بیماران جهت کنترل علائم و نشانه‌های افزایش غلظت این داروها در خون مورد بررسی قرار گیرند.
- در طول درمان با تری فلونوماید، ریفاپمپین، کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توتین و علف جای بایستی با احتیاط مصرف شود.

هشدارها

قبل از مصرف تری فلونوماید تمام شرایط پزشکی خود را به پزشک خود اطلاع دهید اگر:

- مشکلات کبد یا کلیه دارید.
- تب یا عفونت دارید یا نقص سیستم ایمنی دارید.
- بی‌حسی یا گزگز شدن در دست‌ها و پاها را تجربه می‌کنید که متفاوت با علائم بیماری ام اس است.
- به دیابت مبتلا هستید.
- دچار مشکلات پوستی جدی در مصرف داروهای دیگری شده‌اید.
- مشکلات تنفسی دارید.
- فشارخون بالا دارید.
- به نوزاد خود شیر می‌دهید یا برنامه شیردهی دارید.

در طول درمان با این دارو از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل خودداری نمایید.

از مصرف تری فلونوماید خودداری کنید اگر:

- مشکلات کبدی شدید دارید.
- باردار هستید یا در سنین باروری هستید و از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنید.
- به لفلونوماید، تری فلونوماید یا هر یک از ترکیبات تری فلونوماید حساسیت داشته‌اید.
- دارویی به نام فلونوماید مصرف می‌کنید.

از آنجایی که قرص تری فلونوماید حاوی لاکتوز است، بیماران مبتلا به مشکلات ارثی نادر مانند عدم تحمل گالاکتوز، کمبود لاکتاز، کلی، یا سو جذب گالاکتوز-لاکتوز بایستی از مصرف این محصول دارویی خودداری کنند.

پزشک خود را در مورد تمام داروهای که مصرف می‌کنید، از جمله داروهای تجویزی یا نسخه یا داروهای بدون نسخه، ویتامین‌ها و مکمل‌های گیاهی مطلع سازید.

در صورتی که داروهای مصرف می‌کنید که احتمال ابتلا به عفونت‌ها را افزایش می‌دهند، مانند داروهای که برای درمان سرطان یا کنترل سیستم ایمنی استفاده می‌شوند، پزشک معالج خود را مطلع کنید.

دوز فراموش شده

اگر یک دوز تری فلونوماید را فراموش کردید، برای جبران دوز فراموش شده از دو برابر کردن دوز دارو خودداری کنید و دوز بعدی داروی خود را طبق زمانبندی مصرف کنید.

مصرف بیش از حد

در صورت مصرف بیش از حد قرص‌های تری فلونوماید فوراً با پزشک معالج تماس بگیرید یا بلافاصله به نزدیک‌ترین اورژانس مراجعه کنید. در صورت مصرف بیش از حد قابل توجه تری فلونوماید یا مسمومیت، کلسیرامین و زغال فعال به منظور تسریع دفع تری فلونوماید از جریان خون توصیه می‌گردد.

بارداری و شیردهی

مصرف تری فلونوماید ممکن است به نوزاد متولد نشده شما آسیب برساند. در صورتی که باردار هستید یا مصرف تری فلونوماید خودداری کنید.

لازم است زنان قبل از شروع مصرف تری فلونوماید تست بارداری انجام دهند. در طول درمان با تری فلونوماید از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

پس از قطع مصرف تری فلونوماید، همچنان از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده کنید تا زمانی که نتایج آزمایشات خون نشان دهند که سطح تری فلونوماید خون شما به اندازه کافی پیدا کرده است. اگر در حین مصرف تری فلونوماید یا دو سال پس از قطع مصرف دارو باردار شدید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

مردانی که تحت درمان با تری فلونوماید هستند:

در صورتی که همسر شما قصد بارداری دارد، باید مصرف دارو را قطع نموده و در مورد روش‌های تسریع کننده دفع دارو از خون از پزشک معالج خود سوال کنید.

در صورتی که همسر شما قصد بارداری ندارد، لازم است شما و همسرتان از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری در طول درمان با تری فلونوماید استفاده کنید. پس از قطع مصرف دارو نیز تری فلونوماید در خون شما باقی می‌ماند، بنابراین تا زمانی که سطح تری فلونوماید در خون شما بررسی شود و اطمینان حاصل شود که سطح دارو به اندازه کافی کاهش یافته است، از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

ترشح تری فلونوماید در شیر مادر نامشخص است. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار، در حین درمان با تری فلونوماید بایستی از شیردهی به نوزاد خود اجتناب کنید. در مورد قطع شیردهی یا قطع مصرف دارو یا راهنمایی پزشک معالج باید تصمیم گرفته شود. از شیردهی به نوزاد خود در حین درمان با تری فلونوماید اجتناب کنید.

توصیه به بیمار

تری فلونوماید را یک بار در روز مصرف کنید.

بیماران می‌توانند این دارو را همراه با غذا مصرف نمایند ولی مصرف این دارو با معده خالی نیز امکان پذیر است.

ممکن است تری فلونوماید تا ۲ سال پس از قطع مصرف دارو در خون شما باقی بماند. پزشک معالج شما به منظور کمک به کاهش سریعتر سطح دارو از جریان خون شما برایتان داروهای مورد نیاز را تجویز می‌کند. در صورتی که به اطلاعات بیشتر در این باره نیاز دارید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

نحوه نگهداری

- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگه دارید.
- مواد جاذب رطوبت را از قوطی خارج نکنید و تبلیغید. دارو را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- قرص‌هایی که دیگر استفاده نمی‌شوند و یا تاریخ مصرف آن‌ها گذشته است را به روشی ایمن دور بیندازید.

محتویات بسته

قوطی حاوی ۲۸ عدد قرص روکش دار

تولیدکننده: شرکت نوبیرون دارویی کیمیا. تهران - ایران.

تلفن: ۰۲۱-۶۴۳۳۱۴

وب سایت: www.kimia-pharma.com

منابع

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/202923o13s015bl.pdf
BNF 81, March - September 2021
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aubagio-epar-product-information_en.pdf