

سوپستراهای CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19: تجویز هم زمان انکستری® با سوپستراهای خاص، CYP2C19 سبب کاهش غلظت این سوپستراها شده، و در نتیجه ممکن است کاری این کاهش یابد. از مصرف هم زمان می شود، بایست خودداری نمود. اگر نمی توان از مصرف هم زمان اختناک کرد، دوز این سوپستراها را نظر پزشک معالج مطابق با اطلاعات تجویز آنها باستی افزایش یابد.

هشدارها

- قبل از مصرف انکستری® تعام شرابیت پزشکی خود را به پزشک خود اطلاع دهید اگر:
- ساقمه تشنج، اسیب مغزی، سکته مغزی یا تومور مغزی دارید.
- ساقمه بیماری قلبی دارید.
- شمار خون بالا دارید.
- افزایش غیرطبیعی چربی یا کاسترول خون (دیس لیدیمی).
- باردار هستید یا قصد بارداری دارید. انکستری® می تواند به جنین آسیب برساند و یا منجر به سقط جنین شود.
- همسرتان باردار است یا توأمی باردار شدن دارد.
- در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید.

پزشک خود را در مورد تعام داروهای که مصرف می کنید، از جمله داروهای تجویزی را ناسخه یا داروهای بدون نسخه، ویتمان ها و مکمل های یا کاهن مطلع سازید. انکستری® و سایر داروها ممکن است روی هم تأثیر گذاشته و باعث بروز عوارض جانبی شوند.

نباید مصرف هیچ دارویی را شروع کرده یا متوقف کنید، قبل از این که با پزشکی که انکستری® را برای شما تجویز کرده صحبت کنید. در مورد داروهای مخصوص خود آگاه باشید. لیستی از آنها را باشته باشد تا هنگام دریافت دارویی که دیدید به پزشک و داروساز خود نهان شده.

دوز فراموش شده

اگر یک دوز دارویی انکستری® خود را فراموش کردید، می بایست به محض آنکه به خاطر آورده باشد، دوز دارو را همان روز مصرف کنید. در صورتی که دوز روزانه ی خود را مصرف نکرده اید، می بایست روز بعد، دوز معمول تجویز شده را در زمان همیشگی مصرف کنید. از صرف بیش از دو تجویز شده انکستری® روزانه باید اختناک نمود.

صرف بیش از حد

اگر شما بیش از حد انکستری® مصرف نمودید، بلاضراله با پزشک خود و یا اورژانس تماس بگیرید. با مصرف بیش از حد دارویی انکستری®، ممکن است ریسک تشنج در شما افزایش یابد.

بارداری و شیشه

صرف این دارو در دو دارویی و شیشه‌ی و شیرده‌ی و همچنین در بانوان که قصد بارداری دارند ممنوع است. کپسول های باردار و یا اسیب دیده اینکستری® نباید ت渥ه نتائی که باردار هستند با می خواهند باردار شوند، بدون محافظت مانند دستکش لمس شوند. انکستری® مضرای را بای جنین و رسک سقط جنین ایجاد خواهد نمود. اگر شما باردار هستید و یا برنامه باردار شدن دارید و یا اگر همسر شما باردار است و یا ممکن است باردار باشد فوراً به پزشک خود اطلاع دهید. هم زمانی که همسر آن ها توانایی بازوری دارد و یا همسر باردار از دندرن، در طول درمان با انکستری® و تا سه ماه بعد از آخرین دوز این دارو باشد از کانونهای عدوه یک روش موثر جلوگیری از بارداری استفاده کنند. انکستری® می تواند سبب اختلال بازوی در مردان شود.

ترخیخ انکستری® در شیر مادر نامشخص است. اگر در حال شیردهی هستید یا قصد شیردهی به نوزاد خود را در این دارو با پزشک خود اطلاع دهید. شما و پزشکان باید در مخصوص مصرف انکستری® و یا شیردهی تضمیم بگیرید. از مصرف هم زمان دارو با شیردهی خودداری کنید.

توصیه به بیمار

- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.
- هر روز در زمان مخصوص اینکستری® را مصرف کنید.
- پزشک شما ممکن است در سوت یا نیاز دارویی شما را تغییر دهد.
- مصرف اینکستری® را بدون مشورت با پزشک خود تغییر نداده و یا متوقف نکنید.
- انکستری® را می توانید همراه با غذای دهنده باشد یا با معده خالی مصرف کنید.
- کپسول های انکستری® را کامل بپلمپید. کپسول را بتجویز، حل کنید و باز نکنید.
- اگر شما در حال دارمان با هم زمان آزادساز آگاداتر و تقویت (GnRH) استسید، باید این دارمان را همراه با انکستری® ادامه دهید مگر زمانی که برای کاهش تستستورون بدن قاتن تحت عمل جراحی (پرداشتن بینه ها) قرار گرفته باشد.

نحوه نگهداری

- دارو را دور از نور و رطوبت، در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- کپسول های انکستری® را در محیط خشک و در بسته بندی اصلی دور از رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس اطفال نهاده.
- کپسول های انکستری® که دیگر استفاده نمی شوند و یا تاریخ مصرف آن گذشته است بالحاظ موارد اینمی، معدوم کنید.

محظوظ است

هر جمیه حاوی ۶ ورق بلیسترن ۵ تایی، معادل ۳۰ عدد کپسول زلائی نرم است. هر ۴ جمیه ۳۰ عددی در یک جعبه بزرگتر قرار دارد.

دارنده پروانه ساخت: شرکت نوآوران دارویی کیمیا
تلفکس: ۰۱۰-۶۶۴۳۷۰۲۴
وب سایت: www.kimia-pharma.co

منابع

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/203415s018,213674s005lbl.pdf
BNF 83: March–September 2022
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xtandi-epar-product-information_en.pdf

پیش از مصرف انکستری® بروشور را بدقع مطالعه نمایید. این بروشور در یگرینه پاسخ سوالات شایع در مورد انکستری® است. این دارو برای بیماران غلیق معمول شده است، لذا از صرف آن در موارد مشابه یا توسعه آن به دیگران خودداری نمایید. برای کاربران عوارض جانبی، با شرکت نوآوران دارویی کیمیا با شماره ۰۹۰۸۲۱۶۴۳۲۵۱۴ و یا از طریق ایمیل medical@kimia-pharma.co در تعاس پاشه.

این بروشور را قبل از شروع مصرف انکستری® با دقت بخوبی زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شماست. این بروشور جایگزین برای مشاوره با پزشک یا پرستارهای دارمانی پزشک نیست.

تکیه
هر کپسول زلائی نرم انکستری® ۴۰ میلی گرم، حاوی ۴۰ میلی گرم ازالوتامید است.

مکاپسیم اثر
از ازالوتامید یک مهازنده گیرنده اندروژنی است.

فارمادکوبکتی
جد: میانگین زمان رسیدن به مکریم غلظت پلاسمایی (T_{max}) به دنبال تجویز خوارکی کپسول های انکستری® ۱۶۰ میلی گرم

روزانه ۱۴ ساعت (ین ۰،۵ تا ۲۰ ساعت).
توزیع: میانگین حجم توزیع انکستری® در بیماران بعد از یک دوز مصرفی خوارکی ۱۰۰ لیتر (۰،۹۶ تا ۰،۹۸ تا ۰،۹۷ لیتر).

دوس به پروتئین های پلاسمایی متعلق می شود.

متاپولیسم: متابولیسم آزمایشگاهی آنژین های CYP2C4 و CYP3A4 مسؤول متاپولیسم انکستری® هستند.

دق: مسیر اولیه حلق انکستری® از طریق متاپولیسم کبدی است. به دنبال تجویز خوارکی ^{14}C -enalutamide ۰،۶٪ در دارو و ۱۳٪ در مفعول بازیابی شده است.

مواد مصرف

انکستری® در مواد زیر تجویز می شود:
• درمان بیماران مبتلا به Castration-resistant prostate cancer (CRPC)- سرطان پروستات مقاوم به فقدان هرمون مردانه
• درمان بیماران مبتلا به metastatic castration-sensitive prostate cancer (mCSPC)- سرطان پروستات متاستاتیک حساس به فقدان هرمون مردانه
ایمنی و کارایی انکستری® در زنان و کودکان نامشخص است.

مقدار و نحوه مصرف
• میان دوز توصیه شده انکستری® ۱۶۰ میلی گرم روزانه یک بار می باشد. انکستری® می تواند با یادون غذا مصرف شود.
• بیمارانی که انکستری® را دریافت می کنند می بایست به طور هم زمان آنالوگ هرمونی آزاد کننده گادادوتروپین (GnRH) را دریافت نموده و یا با پیاسیت ارکتوئی دو طرفه (پرداشتن هر دو بینه) در آنها انجام شود.

عارض جانبی
لام به ذکر است این عوارض در تمام بیماران رخ نمی دهدن. عوارضی که در این بروشور ذکر شده شامل کلیه عوارض احتمالی انکستری® نیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص عوارض دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

انکستری® ممکن است منجر به عوارض جانبی چندی زیر شود:

• شستیج انکستری® با افزایش رسک شتشیج و از سدت دادن هوشیاری همراه است. شرابیلی که ممکن است بیمار را مستعد ششنج کند و داروهایی که ممکن است آستانه تنشیز را تنشیز دهند باید مورد بررسی قرار گیرند. از اینجام فعالیت هایی که از سدت دادن یا آگاهی هوشیاری در آنها می توانند منجر به اسیب های جدی به خودان باشد یا دیگران شو خودداری کنید. در صورتی که هوشیاری خود را از دست داده با دچار شتشیج شدید، می بایست به سرعت به پزشک مطلع خود مراجعه نمایید.

• سندروم انسفالوایاتی خلفی برگشت پذیر (Posterior reversible encephalopathy syndrome - PRES) - مصرف انکستری® ممکن است رسک ایجاد شرایط اغزی که به عنوان شاشخه شناسی معرفی شده اند در صورت پرورش شتشیج سریع عالمی مانند درد، کاهش هوشیاری، گیجی، کاهش بینایی، تاری دید و دیگر اختلالات بینایی، با افاضه اصله به پزشک خود مراجعه نمایید.

• افزایش حساسیت: امکان بروز واکنش های حساسیتی در بیماران تحت درمان با انکستری® وجود دارد. انکستری® می تواند با واکنش های ایندند ادم مورث، زبان، لب یا گلو همراه باشد. در این حالت دارو باید قطع شود و فوراً به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

• بیمارای ایسکمی قلبی: در برخی افراد تحت درمان با انکستری®, گرفتگی سرخرگ های قلبی (بیماری ایسکمی قلبی) می توانند تهدید کننده حیات باشد. پزشک می بایست عالم و نهانه های مشکلات قلبی بیمار را طی درمان با انکستری® بررسی نماید. در مرضان با انکستری® با پزشک تعاضتی مانند درد، کاهش هوشیاری، چشم پیچیده و تیگی نفس در طول درمان با انکستری® می توانند منجر به افزایش رسک افغانان و شکستگی شود. دلیل افتادن از دست دادن هوشیاری (غش کردن) با شنت بروزد است. پزشک رسک افغانان و شکستگی را در طی درمان با انکستری® وجود دارد. اینکستری® می تواند خواهد کرد.

پزشک عالم در صورت بروز عوارض جانبی شدید، درمان با انکستری® را متوقف خواهد نمود.

در صورت داشتن عالم فوکی بلا فاعله با افراد کادر سلامت (پزشک، داروساز و...) تماس بگیرید.

شایع ترین عوارض جانبی

شایع ترین عوارض جانبی در افرادی که انکستری® مصرف می کنند عبارتند از:

- ضعف بدی یا احساس خستگی بیش از حالت معمول
- کمر در
- گرفتگی
- بویس
- درد مفاصل
- کم شدن اشتها
- اسهال
- افزایش فشار خون

تماثلات دارویی

CYP2C8: از تجویز هم زمان انکستری® با مهازنده های قوی CYP2C8 (جم. فیروزیل) در صورت

امکان اجتناب شود، زیرا منجر به افزایش مواجه با انکستری® در شرابیلی که امکان اجتناب از تجویز هم زمان انکستری® با مهازنده قوی CYP2C8 وجود ندارد دوز انکستری® باید توسعه پزشک کاهش داده شود.

CYP3A4: از تجویز هم زمان انکستری® با ریفارمین (Rifampin) یا عنوان یک الکافنده قوی CYP3A4 و الکافنده متوسط (CYP2C8) تا حد امکان می بایست اجتناب شود، زیرا منجر به کاهش غلظت پلاسمایی در نتیجه کاهش اثر بخشی انکستری® می گردد. شرابیلی که امکان اجتناب از تجویز هم زمان انکستری® با الکافنده قوی CYP3A4 وجود ندارد دوز